

XenTari Raupenfrei 4 x 3 g

Sorgt für sofortigen Fraßstopp bei Schadraupen an Zierpflanzen, Obst und Gemüse

Artikelnr.: 618548

GTIN: 4005240185483

Zulassungsnummer:

Pfl.Reg.Nr.: 3431

Wirkstoff:

540 g/kg (54 % w/w) *Bacillus thuringiensis* var. *aizawai*

Anwendungsgebiete:

Zierpflanzenbau: Gegen freifressende Schmetterlingsraupen und Raupen von Eulenarten an Zierpflanzenkulturen im Freiland, Gemüsebau: Gegen freifressende Schmetterlingsraupen und Raupen von Eulenarten an Kohlgemüse im Freiland*, Obstbau: Freifressende Schmetterlingsraupen an Kernobst im Freiland*, Weinbau: Gegen Einbindige und Bekreuzte Traubenwickler an Weinreben im Freiland*

*Für die Verwendung im Haus und Kleingartenbereich zulässig

Kultur	Aufwandmenge	Anwendungen
Zierpflanzenbau: Zierpflanzen im Freiland		
Freifressende Schmetterlingsraupen (ausg. Eulenraupen)	3 g in 3 L Wasser für 50 m ² (Pfl.Höhe < 50 cm), 33,3 m ² (50-125 cm), 25 m ² (> 125 cm)	max. 6 Anwendungen im Abstand von 5-7 Tagen
Eulenraupen (Noctuidae)	3 g in 1,8 L Wasser für 30 m ² (Pfl.Höhe < 50 cm), 20 m ² (50-125 cm), 15 m ² (> 125 cm)	max. 5 Anwendungen im Abstand von 5-7 Tagen
Gemüsebau: Kohlgemüse im Freiland*		
Freifressende Schmetterlingsraupen (ausg. Eulenraupen)	3 g in 3 L Wasser für 50 m ²	max. 6 Anwendungen im Abstand von 5-7 Tagen
Eulenraupen (Noctuidae)	3 g in 1,8 L Wasser für 30 m ²	
Obstbau: Kernobst im Freiland*		
Freifressende Schmetterlingsraupen	3 g in 3 L Wasser für 60 m ² /m Kronenhöhe	max. 4 Anwendungen im Abstand von 8-14 Tagen
Weinbau: Weinreben (Nutzung als Tafel- und Keltertrauben) im Freiland*		
Einbindiger Traubenwickler (Eupoecilia ambiguella), Bekreuzter Traubenwickler (Lobesia botrana)	6 g in 3,75 L Wasser für 37,5 m ²	max. 6 Anwendungen im Abstand von 8-14 Tagen

Anwendungszeitraum:

Weinbau/Obstbau: Nach Befallsbeginn oder ab Warndienstaufruf, ab Schlüpfen der ersten Larven, Larvenstadium L1-L2. Gemüsebau: Nach Befallsbeginn oder ab Warndienstaufruf, ab Schlüpfen der ersten Larven, Larvenstadium L1-L3. Zierpflanzen: Nach Befallsbeginn oder ab Warndienstaufruf, ab Schlüpfen der ersten Larven, ab Larvenstadium L1: freifressende Raupen bzw. L1-L4: Eulen.

Mischbarkeit:

-

Pflanzenverträglichkeit:

-

Gebrauch:

Die Pflanzen vollständig mit der Spritzbrühe benetzen, sobald Raupen oder Raupenfraßstellen erkennbar sind. Bei Befall mit Buchsbaumzünsler auch Pflanzeninneres mit behandeln. Frühe Spritzung erhöht den Erfolg! Behandlung bei starkem Befall und ungünstiger Witterung (z. B. Niederschläge) wiederholen. Bei der Spritzung sollte die Temperatur über 15° C liegen. Bereits wenige Stunden nach Aufnahme des Mittels stellen die Raupen ihre Fraßtätigkeit ein. Nach 3-5 Tagen sterben sie und fallen von der Pflanze.

Kontrollen:

-

Hinweise zum Schutz des Anwenders:

Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen.

Hinweise zum Schutz der Umwelt:

Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen/Indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.) Zum Schutz von Gewässerorganismen bzw. Nichtzielpflanzen nicht auf versiegelten Oberflächen wie Asphalt, Beton, Kopfsteinpflaster (Gleisanlagen) bzw. in anderen Fällen, die ein hohes Abschwemmungsrisiko bergen, ausbringen. Schädlich für Nützlinge. Eine nicht bestimmungsgemäße Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Originalverpackungen oder entleerte Behälter nicht zu anderen Zwecken verwenden. Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

Anwendungs- und Sicherheitsbestimmungen:

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Gefahrenhinweise:

Achtung

Verursacht schwere Augenreizung. Vorsicht Pflanzenschutzmittel! Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Verschüttete Mengen aufnehmen. Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen. Enthält *Bacillus thuringiensis* subsp. *aizawai*. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Für Frischluft sorgen. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Hinweise für den Arzt: Keine produktspezifischen Symptome bekannt, symptomatisch behandeln.

Entsorgung:

Altbestände und Reste nicht mit dem Hausmüll, über das WC oder die Kanalisation entsorgen. Sonderabfallsammler übergeben. Entleerte Verpackung nicht wiederverwenden.

Lagerung:

Nur im Originalbehälter aufbewahren.

Haltbarkeit:

volle Wirksamkeit bei sachgerechter Lagerung bis mindestens 36 Monate ab Produktionsdatum.

Zusatzinformation:

-